



Carozos

PROGRAMA FITOSANITARIO



Bayer CropScience

Si es Bayer, es bueno

Carozos

PROGRAMA FITOSANITARIO



Yema hinchada



Botón rosado



Inicio flor



Plena flor



Caída de pétalos



Caída de chaquetas



Crecimiento de frutos



Pre - cosecha



Post - cosecha

Plagas



Movento

Nuevo

Confidor Forte

Calypso

Calypso

Envidor

Confidor Forte

Escama de San José /
Pulgón verde del duraznero / Chanchitos blancos
Pulgón verde del duraznero / Chanchitos blancos

Pulgón verde del duraznero

Polilla oriental de la fruta

Arañita roja europea / Arañita bimaclada /
Falsa arañita roja de la vid

Chanchitos blancos

Enfermedades



Pomarsol Forte

Mystic - Consist Full

Horizon - Consist Full

Teldor 50% WP / 500 SC - Rovral 50% WP / FLO

Horizon

Cloca del duraznero / Tiro de munición / Monilia

Tizón de la flor (Monilia - Botritis) / Oídio

Oídio del duraznero

Botritis

Geotrichum

Malezas



Weedout

Hache Uno 2000

Basta

Malezas de hoja ancha

Malezas gramíneas

Malezas anuales y perennes,
sierpes y brotes basales





Plagas

| Producto | Plagas | Concentración |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Calypso 480 SC | Polilla oriental de la fruta | 20 cc/hL de agua |
| | Pulgón verde del duraznero | (mínimo 300 cc/ha) |
| Confidor Forte 200 SL | Chanchitos blancos | 80 - 100 cc/hL de agua |
| | Pulgón verde del duraznero | 30 - 50 cc/hL de agua |
| | Langostinos | 20 cc/hL de agua |
| Envidor 240 SC | Arañita roja europea | 50 - 60 cc/hL de agua |
| | Arañita bimaculada | |
| | Falsa arañita roja de la vid | |
| | Arañita roja del palto | |
| Movento 100 SC | Arañita parda de los frutales | 100 cc/hL de agua |
| | Escama de San José | |
| | Pulgón verde del duraznero | |
| | Chanchitos blancos | |



Enfermedades

| Producto | Enfermedades | Dosis o concentración |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Consist full 75% WG | Oídio | 20 g/hL de agua |
| | Tizón de la flor (Monilia - Botritis) | 30 - 40 g/hL de agua |
| Horizon 25% WP | Oídio | 40 - 60 g/hL de agua |
| | Botritis / Geotrichum | 120 g/hL de agua |
| Mystic 520 SC | Tizón de la flor / Oídio | 40 cc/hL de agua (600 cc/ha) |
| Pomarsol Forte 80% WG | Cloca del duraznero | 200 - 250 g/hL de agua |
| | Tiro de munición | |
| | Tizón de la flor | |
| Rovral 50% WP | Botritis floración y/o pre-cosecha | 100 - 125 g/hL de agua (1,5 - 2,0 kg/ha) |
| | Botritis post-cosecha | 75 - 100 g/hL de agua |
| Rovral 4 Flo | Botritis floración y/o pre-cosecha | 100 - 125 cc/hL de agua (1,5-2,0 L/ha) |
| | Botritis post-cosecha | 75 - 100 cc/hL de agua |
| Teldor 50% WP | Botritis floración y/o pre-cosecha | 80 g/hL de agua (1,6 kg/ha) |
| | Botritis post-cosecha | 180 g/hL de agua |
| Teldor 500 SC | Botritis floración y/o pre-cosecha | 80 cc/hL de agua (1,6 L/ha) |
| | Botritis post-cosecha | 180 cc/hL de agua |



Malezas

| Producto | Malezas | Dosis o concentración |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| Basta 14 SL | Malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. | 2 - 3 L/ha |
| | Desmanche de malezas perennes | 2% (2 L/hL de agua) |
| | Sierpes y brotes basales (menores a 30 cm de altura) | 1,5 - 2% (1,5 - 2 L/hL de agua) |
| Hache Uno 2000 175 EC | Malezas gramíneas, anuales y perennes | 0,75 - 4 L/ha |
| Weedout 400 SL | Malezas anuales y perennes de hoja ancha | 2,2 - 4 L/ha |

hL: hectolitro ó 100 L de agua.



Fonos: (2) 520 8200 Santiago
 (51) 23 3728 Coquimbo
 (72) 39 1017 Rancagua
 (73) 21 3748 Linares
 (45) 33 2866 Temuco

www.bayercropscience.cl

ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.



Programa Fitosanitario en Carozos